

คาโบแซนทินิบ
ความแรง 20 และ 40 และ 60 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า CABOMETYX (คาโบเมติกซ์)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คา-โบ-แซน-ทิ-นิบ (cabozantinib) เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งไตและโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ความดันเลือดสูง
 - กำลังท้องเสีย
 - มีประวัติเลือดออกมาก
 - มีประวัติลิ้มเลือดออกผิดปกติ
 - เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ
 - เป็นโรคไตอักเสบเรื้อรัง
 - โรคตับหรือโรคไต
 - เคยผ่าตัดหรือทำฟันในเดือนที่ผ่านมา หรือกำลังจะผ่าตัดหรือทำฟัน เพราะยานี้จะทำให้แผลหายยาก
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือให้นมลูก
 - แขนงตาลนมน
 - อายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัย
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

"หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือกินยาใดอยู่ โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร"

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาตอนท้องว่าง คือ กินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และไม่กินอาหารภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยา
- **กลืนยาทั้งเม็ด** ห้ามเคี้ยว บด หรือ หักเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมงให้รอ กินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่ากำลังใช้ยานี้หากต้องการผ่าตัดหรือทำฟัน
- **ผู้หญิง** จะต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่แพทย์แนะนำ ในระหว่างที่ใช้ยานี้และหลังจากสิ้นสุดการรักษาอย่างน้อย 4 เดือน หากพบว่าตั้งท้องต้องแจ้งแพทย์ทันที
- **ผู้ชาย** จะต้องคุมกำเนิดด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่ใช้ยานี้และหลังจากสิ้นสุดการรักษาอย่างน้อย 4 เดือน
- **ไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน** เช่น ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดกิน ยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนัง เพราะอาจไม่ได้ผล
- **ไม่ควรให้นมบุตร** ระหว่างใช้ยานี้และหลังจากสิ้นสุดการรักษาอย่างน้อย 4 เดือน เนื่องจากยานี้สามารถผ่านเข้าไปในน้ำนมได้

- อย่ากินผลเกรปฟรุตหรือดื่มน้ำเกรปฟรุตระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดออก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - แขนและขาบวม
 - อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด บัสสาวะเป็นเลือด ไอเป็นเลือด
 - แผลเรื้อรัง รักษาไม่หาย
 - หมดสติ
 - ปวดหัว สับสน ไม่ค่อยมีสมาธิ
 - เจ็บช่องปาก มีแผลหรือมีอาการบวมในช่องปาก ปวดฟัน ปวดเหงือก หรือฟันโยก
- "ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เวียนหัว อ่อนเพลีย ง่วงซึม
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด การรับรสเปลี่ยนไป
- ท้องเสีย ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งท้อง
- มีตุ่ม หรือปวดที่มือหรือฝ่าเท้า
- ความดันเลือดสูง
- เจ็บคอ ช่องปากหรือลำคอบวมแดง พุดลำปากปากแห้ง เสียงแหบ ไอ
- เป็นสิ่ว ผอมร่วงมากกว่าปกติ
- ริดสีดวงทวาร

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

6.ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7.ลักษณะและส่วนประกอบยาเม็ด

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีเหลือง มีทั้งหมด **3 ความแรง**
 - ความแรง 20 มิลลิกรัม – เม็ดกลม ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์ "XL" อีกด้านมีตัวพิมพ์ "20"
 - ความแรง 40 มิลลิกรัม - เม็ดสามเหลี่ยม ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์ "XL" อีกด้านมีตัวพิมพ์ "40"
 - ความแรง 60 มิลลิกรัม - เม็ดรูปไข่ ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์ "XL" อีกด้านมีตัวพิมพ์ "60"
- **ตัวยาสำคัญ** คาโบแซนทีนิน
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ไมโครคริสทัลไลน์เซลลูโลส พีเอช 102, แลคโทสแอนไฮดรัส, ไฮดร็อกซีโพรพิลเซลลูโลส, ครอสคาเมลโลสโซเดียม, คอลลอยด์ซิลิโคนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไฮโปรมेलโลส 2910, โททาเนียมไดออกไซด์, ไตรอะซีทีน, ไอร์ออนออกไซด์เฮลโลว์

ผู้ผลิต Patheon Inc, ประเทศแคนาดา

ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

จำกัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ชั้น 8-9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4 ธันวาคม พ.ศ.2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

